

MORAM LI SE LIJEČITI?

Velik broj ljudi s dijagnozom sporo napredujućeg raka krvi ne treba odmah početi s liječenjem. Neke osobe prilikom dijagnoze ne muče nikakvi simptomi pa ne trebaju odmah početi s liječenjem, ponekad čak mjesecima ili godinama, a možda nikada neće ni morati.

Kako danas imamo vrlo učinkovite načine liječenja kronične limfocitne leukemije, ali ne možemo potpuno izliječiti samu bolest, s liječenjem se počinje tek kada bolest postane izraženija ili kada se pojave jasni znakovi njezina napredovanja. Liječnici uglavnom započinju s liječenjem pri pojavi sljedećih simptoma:

- umor, značajan gubitak težine, vrlo izražena noćna znojenja
- natečeni limfni čvorovi



Stock photo. Posed by model.

Nalazi krvi koji pokazuje da bolest brzo napreduje. Nakon što se utvrdi da je potrebno započeti s liječenjem, bolesnik se pažljivo pregledava kako bi se odabrala najprikladnija terapija za njegov slučaj. Osim značajki same kronične limfocitne leukemije (napredak i razvojni stadij raka krvi u vašem slučaju), bolesnik se procjenjuje i kao osoba kako bi se odabrao optimalan način liječenja za svaki pojedini slučaj. Pri odabiru liječenja uglavnom se uzima u obzir dob bolesnika ali i njegov fizički status, takozvana procjena općeg tjelesnog stanja, kao i prisutnost odnosno odsutnost drugih bolesti povezanih s kroničnom limfocitnom leukemijom, takozvani komorbiditet. Ta je procjena posebno važna za osobe starije dobi kako bi se odabralo učinkovito liječenje uz prihvatljiv stupanj toksičnosti terapije.

Na samom je kraju prije donošenja odluke o najprikladnijem načinu liječenja jednako važno procijeniti određene biološke značajke stanica leukemije. Postojanje određenih genetskih promjena odlučujući je faktor za odabir najprikladnijeg liječenja.

PHCR/IBR/0917/0007

[/hr/bolesti/kronicna-limfocitna-leukemija-kll/lijecenje/mogucnosti-](#)

[lijecenja/moram-li-se-lijeciti](#)