

DODATNI LIJEKOWI

Osim antipsihotika i korektivnih lijekova, u liječenju psihoza primjenjuju se i drugi lijekovi. Osobito u situacijama kada bolesnik prolazi kroz značajne promjene raspoloženja (kao što je depresija) ili promjene ponašanja (npr. agresivnost). Tada se korišteni antipsihotici (tipični ili atipični) kombiniraju s antidepresivima ili stabilizatorima raspoloženja. Navedeni lijekovi spadaju u skupinu psihotropnih lijekova.



Stock photo. Posed by model.

Psihotropni lijekovi uključuju lijekove koji djeluju selektivno i specifično na mentalne procese i pozitivno utječu na središnji živčani sustav bolesnika i njegovu/njezinu psihu. Mogu se podijeliti u sljedeće skupine:

- antipsihotici,
- anksiolitici i sedativi,
- antidepresivi,
- stabilizatori raspoloženja,
- lijekovi za induciranje sna, hipnotici,
- lijekovi za kognitivne funkcije, odnosno lijekovi koji održavaju funkcije pamćenja u osoba s demencijom.

Anksiolitici i sedativi

Anksiolitici i sedativi pripadaju uglavnom skupini derivata benzodiazepina.

Upamtite!

Oni imaju blage sedativne učinke, smanjuju mentalnu napetost i tjeskobu te stoga olakšavaju padanje u san.

Iz tog razloga upotrebljavaju se u općoj medicini i psihijatriji kao dodatni lijekovi u liječenju somatskih i mentalnih poremećaja uzrokovanih stresom, kao što su:

- određeni oblici hipertenzije,
- koronarna bolest,
- želučane ulceracije,
- poremećaji spavanja,

- stanja emocionalne napetosti u teškim životnim situacijama,
- tjeskobni poremećaji.

Dobro je znati...

Ti lijekovi imaju brze i privremene učinke, kao što su smanjena mentalna napetost, ali njihovo opetovano uzimanje može izazvati ovisnost.

Znak rizika od ovisnosti jest potreba za uzimanjem lijeka češće i u većim dozama nego je propisao liječnik. Visok rizik od ovisnosti razlog je za pažljivu uporabu i strogo pridržavanje preporuka liječnika.

Iz tog razloga oni se ne upotrebljavaju za dugoročno liječenje nego se primjenjuju povremeno kao kratkoročno, dodatno liječenje. Tjeskoba se također liječi antidepresivima koji imaju anksiolitičke učinke, ali ne izazivaju ovisnost.

Antidepresivi

Antidepresive karakterizira pozitivan učinak na simptome depresije, a poboljšavaju i sniženo raspoloženje i motivaciju, smanjuju napetost i tjeskobu i poboljšavaju spavanje. Neki antidepresivi pokazuju veće sedativne učinke, dok drugi stimuliraju aktivnost.

Stoga je važno takve lijekove dobiti u strogoj suglasnosti s preporukama liječnika koji će, nakon preciznog pregleda bolesnikovog somatskog i mentalnog stanja, odabrati i propisati antidepresiv prikladan za bolesnika i pratiti tijek liječenja.

Stabilizatori raspoloženja

Stabilizatori raspoloženja lijekovi su koji sprečavaju pojavu simptoma depresivnih i maničnih faza u bipolarnim afektivnim poremećajima ili značajno ublažavaju simptome. Osim toga, nedavno je otkriveno da neki antipsihotični lijekovi nove generacije (atipični), korišteni u dugoročnom režimu, također pokazuju učinke stabilizacije raspoloženja.

Lijekovi za induciranje sna

Lijekovi za induciranje sna olakšavaju padanje u san, no mogu i produžiti fazu sna i smanjiti broj i trajanje buđenja.

Lijekovi za kognitivne funkcije

Lijekovi za kognitivne funkcije, koji se primjenjuju tijekom liječenja neurodegenerativnih bolesti mozga (Alzheimerova bolest i drugi oblici demencije), usporavaju daljnje slabljenje kognitivnih funkcija i na taj način poboljšavaju pamćenje i sposobnosti učenja. Također je utvrđeno da atipični antipsihotici poboljšavaju i kognitivne funkcije.

PHCR/PSY/0917/0002

[/hr/bolesti/shizofrenija/lijecenje/lijekovi-za-lijecenje-shizofrenije/dodatni-lijekovi](#)