

## KEDY JE NUTNÁ HOSPITALIZÁCIA?



Stock photo. Posed by model.

Väčšia časť liečby prebieha mimo nemocnice, obvykle u pacienta doma s rodinou. Niekedy je však nutná hospitalizácia. Pobyť na psychiatrii v nemocnici u pacientov so schizofréniou sa odporúča po epizóde akútnej poruchy kedy:

- pacient nie je schopný kontrolovať svoje správanie do tej miery, že existujú oprávnené obavy, že pacient môže predstavovať hrozbu pre svoju bezpečnosť a pre ostatných (závažné riziko pre ľudské zdravie a život);

- pacient odmieta, že by sa jeho stav zhoršil, odmieta lieky a dá sa predpokladať, že aktuálny stav pacienta sa ďalej zhorší;
- kvôli zhoršenému stavu sa pacient prestal starať o svoje základné potreby, t.j. pacient spí vonku, neje ani nepije;
- pacient so schizofróniou zároveň trpí na závažné telesné ochorenie alebo nežiaduce účinky liekov a bez pobytu v nemocnici nebude možné ich zvládnuť.

## Je dôležité vedieť, že...

Zároveň platí, že počas prvej epizódy sa obvykle odporúča hospitalizácia pacienta, ktorá umožní presné stanovenie diagnózy ochorenia a naplánovanie ďalšej liečby, i keď nie sú naplnené vyššie uvedené kritériá pre hospitalizáciu.

## Viete, že...

Ak pacient nepotrebuje pobyt v nemocnici a výsledky liečby doma sú uspokojivé, pacientovi je možné navrhnúť niekoľko tzv. nepriamych foriem liečby.

Patria sem:

- pobyt v dennom stacionári, napr. od 8:00 do 15:00, po dobu piatich dní týždenne, obvykle v kombinácii s intenzívnou pracovnou terapiou;
- domáca liečba, kedy pacienta doma čas na čas navštívi lekár, psychológ alebo sestra a rodina pacienta plní dennú rolu liečebného opatrovateľa pacienta;

- pobyt v domove – dom alebo byt pre pacientov, obvykle mladých, ktorí sa učia spolupráci a nezávislému životu, navštevujú ich terapeuti a sledujú liečbu;
- liečba v domácom prostredí miesto nemocnice

PHSK/PSY/0917/0001

[/sk/ochorenia/schizofrenia/podpora/prva-navsteva/kedy-je-nutna-hospitalizacia](#)